

ବେଳୁଳ

ალბათ იქნ, რომ შიდგის პროცესებს ფლეხფლეობით კაუნძრიობისათვის გადაუჭრელი პროცესებაა. სხორცი ამიტომ შეიქმნა ეს საინფორმაციო მასალა, რათა პასუხი გაეწეს იმ კითხვებს, რომელიც, ვფიქრობთ, შენ უკავი დიდი ხანია გაინტერესებს და რომელიც დაგეხმარება თავად განსაზღვრო შენი მომავალი. ეს ზროშება საშუალებას მოგენს, თავიდან აირილო: ხარისკო ქრევა, საფრთხე და არქოდნით გამოწვეული შიში.

რა თქმა უნდა, ეს ზროშება ამომნურავ ინფორმაციას ვერ მოგანვითის და შესაძლებელია დამატებითი კითხვების დაკმაყოფილების სურვილის გაგიჩნდეს.

ამისათვის აკრიფე ტელეფონის ნომერი:

თბილისი – 25 18 19, გათუმი – 7 42 13

ქუთაისი – 6 50 26, ზუგდიდი – 2 92 99

ჩენჭრის "ოთხაფგომა" კონსულტაციები უპასუხოდ არ დატოვებენ შენს შეკითხვებს.

გახსოვდეს: ყოველი ზარი ანონიმური და უფასოა.

**შიდსი** - შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი  
- განუვრცებელი ინფექციური დაავადებაა. მას  
იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (აივ).  
ვირუსი ადამიანის ორგანიზმი შეჭრის შემდეგ  
აზიანებს ორგანიზმის დამცავ ანუ იმუნურ სისტემას  
და თანდათანობით მწყობრიდან გამოჰყავს იგი.


**აივ ინფექცია** ეწოდება აივ-ით გამოწვეულ  
დაავადებას ვირუსის შეჭრის მომენტიდან სიცოცხლის  
ბოლომდე, ხოლო ტერმინით **შიდსი** აღინიშნება  
აივ ინფექციის ბოლო სტადია, როდესაც ავადმყოფს  
უფითარდება გარკვეული დაავადებები და/ან იმუნური  
სისტემის მძიმე დაზიანება.

## შიდაის ვირუსი გადაეცემა ერთი კლამისიდან მორის უამძები გზაგით:

- სქესობრივი კონტაქტით  
(ვაგინალური, ორალური,  
ანალური);



- სისხლით: ინფიცირებული სისხლის  
გადასხმისას, აივ ინფიცირებული  
სისხლით დაბინძურებული  
შპრიცის, ნეშის (საინექციო  
ნარკოტიკების მოხმარების დროს)  
გამოყენებისას, არასტერილური  
სამედიცინო და საპარიგმახერო  
ინსტრუმენტების გამოყენების დროს  
(სამართებელი) ტატუირებისას,  
ინდივიდუალური მოხმარების საგნების გაზიარებით  
(კბილის ჯაგრისი, საპარსი);




- ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე  
ან ახალმობილზე მუცლად ყოფნის  
(ფეხბებიმობის), მმობიარობის ან  
ძუძუთი კვების დროს.



## შიდოს ვირუსი არ გადაფის:

- საერთო მოხმარების საგნებით  
(ჭურჭელი, აბაზანა);



- ხელის ჩამორთმევით;



- საუბრისას, დახველებით და  
დაცემინებით;



- კოცნით, მოფერებით;



- მწერებისა და ცხოველების  
ნატენით.



## აივ ინფექციის მიმდინარეობაში და იურები:

აივ ინფექციის მიმდინარეობაში შესაძლებელია ოთხი ფაზის გამოყოფა:

### ფაზების პერიოდი:

ეს არის პერიოდი ინფიცირების მომენტიდან 8-10 კვირის (2-3 თვეს) განმავლობაში, როდესაც სისხლის ანალიზი ვერ გამოავლენს, არის თუ არა ადამიანი აივ-ით ინფიცირებული.

თუმცა, არსებობს სპეციფიკური ანალიზი, რომელიც ამ პერიოდშიც იძლევა დიაგნოზის დასმის საშუალებას.

ამ პერიოდში ხანდახან შეიძლება თავი იჩინოს ისეთმა პრობლემებმა, როგორიცაა ფადარათი, ტემპერატურის მომატება, „გრიპოზული“ მდგომარეობა, ლიმფური კვანძების გადიდება. ეს ნიშნები დამახასიათებელია სხვა დაავადებებისთვისაც, ამიტომ ადამიანმა შეიძლება ეჭვიც არ მიიტანოს აივ ინფექციაზე.

### მსირა სიმატომების ფაზა:

ეს ფაზა, რომელიც პირობითად არის გამოყოფილი ფანჯრის პერიოდის შემდეგ, შესაძლებელია რამდენიმე წელი გაგრძელდეს (საშუალოდ 3-5 წელი). ამ პერიოდში ადამიანი ვირუსის მატარებელია, შეუძლია ინფექციის სხვა ადამიანებისათვის გადაცემა, მაგრამ შეიძლება არ ჰქონდეს ჩივილები და დაავადების ნიშნები. ადამიანი გარეგნულად ჯანმრთელად გამოიყურება. იგი ჩვეულ რითმში აერძელებს ცხოვრებას. შეიძლება ადგილი ჰქონდეს წონაში კლებას,

ზოგად სისუსტეს, ღამის ოფლიანბას, ლიმფური კვანძების გადიდებას ორ ან მეტ ადგილზე (სახარდული, იღლია) ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

## გამოსატული სიმატოგაბის ფაზა:

გამოხატული სიმპტომების ფაზის ხანგრძლივობა საშუალოდ 4-5 წელია. ამ ფაზაში აღამიანის იმუნური სისტემის (ორგანიზმის დამცავი სისტემის) მნიშვნელოვანი დაზიანების შედეგად თავს იჩენს ისეთი ინფექციები და სიმსიგნები (კ. წ. ოპორტუნისტული დაავადებები), რომელნიც ჯანმრთელი იმუნური სისტემის პირობებში უფრო იმკიათად ვითარდება. ეს დაავადებები ძნელად ეჭვემდებარება მკურნალობას.

## შედეგი:

ამ ფაზაში იმუნური სისტემა (ორგანიზმის დამცავი სისტემა) უკე მძიმედაა დაზიანებული. ვითარდება ფილტვების, თავის ტვინის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და სხვა ორგანოების ინფექციური დაავადებები და სიმსიგნები, რომლებიც აღარ ეჭვემდებარება მკურნალობას.

## აივ ინფექციასთან დაკავშირებული კოსელტირების უსახელ

აივ ინფექციაზე გამოკვლევა ადამიანის ცხოვრებაში მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენაა და ამიტომ მას ყოველთვის უნდა ახლდეს კონსულტირება, როგორც გამოკვლევამდე, ასევე გამოკვლევის შემდეგ.

**გამოკვლევამდე** კონსულტირების მიზანია, ადამიანს მიეწოდოს ზუსტი (დაწვრილებითი) ინფორმაცია დააგდების, გამოკვლევის მიმდინარეობის, სარისკო ქცევების შესახებ. ეს ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს აღვილად გასაგებ ენაზე. კონსულტირებისას დრო ესმობა ადამიანის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ანალიზისათვის მომზადებას.

კონსულტირება დაფუძნებულია კონფიდენციალურობის პრინციპზე, რაც ნიშავს, რომ კლიენტისაგან მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ მასსა და კონსულტანტს შორის დარჩება.

**აივ-ზე გამოკვლევის შემდეგ** კონსულტირების მიზანია, ადამიანმა კარგად გააცნობიეროს გამოკვლევის შედეგები. მიუხედავად იმისა, თუ რა იყო ტესტირების შედეგი, აუცილებელია, ადამიანმა გარკვეული დრო დაუთმოს საკუთარი განცდების გაცნობიერებას, დაგეგმოს მომავალი ცხოვრება, იფიქროს სარისკო ქცევის შემცირებაზე და ა.შ.

### ტესტირება აივ ინფექციაზე

იმისათვის, რომ გაიგო, ხარ თუ არა აივ ინფიცირებული, უნდა გაიკეთო სისხლის გამოკვლევა აივ-ზე. ეს გამოკვლევა, როგორც წესი, პასუხს იძლევა ორგანიზმი ვირუსის შეჭრიდან 8-10 კვირის შემდეგ.

არსებობს ანალიზის პასუხის 3 ვარიანტი:



- უარყოფითი** - კლიენტი არ არის ინფიცირებული ან ინფიცირებიდან ჯერ არ გასულა 3 თვე და ადამიანი ფანჯრის პერიოდში იმყოფება.
- დადებითი** - კლიენტი აივ ინფიცირებულია, თუმცა ინფიცირება დადასტურებულად ითვლება მხოლოდ დამადასტურებელი (კონფირმაციული) მეთოდებით ტესტირების შედეგის საფუძველზე
- გაურკვეველი** - ტესტირების მოცემული მეთოდით ამ ეტაპზე შეუძლებელია დადებითი ან უარყოფითი შედეგის დაღვენა; საჭიროა განმეორებითი გამოკვლევა.

## შესაძლებელია თუ არა აივ ინფექციის მარცნალობა?

დღეისათვის აივ ინფექციის სამკურნალოდ არსებობს ანტივირუსული მედიკამენტები. ეს მედიკამენტები ახანგრძლივებენ ადამიანის სიცოცხლეს. თუმცა ისინი სრულიად ვერ თრგუნავენ ვირუსს და მხოლოდ გარკვეული დროით აფერხებენ მის გამრავლებას.

**დღეისათვის აივ ინფექცია/ჟიდის საპოლოო  
განცხრება არ ხდება, ამიტომ აუცილებელია  
ვიზუალური მისი თავიდან აცილებისათვის.**

**როგორ დავისვათ თავი აივ ინფექციისაგან:**

- ერთგული და ჯანმრთელი პარტნიორის ყოლით;
- თუ შენი პარტნიორი არ არის შენი ერთგული ან შენ ერთზე მეტი პარტნიორი გყავს, ყოველი


სქესობრივი კავშირის დროს აუცილებელია კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება;

- მოთხოვე სტერილური სამედიცინო და საპარიკმახერო ინსტუმენტები, ასევე ყოველთვის გამოიყენე ერთჯერადი ნემსები და შპრიცები;
- ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებისაგან თავის შეკავებით;
- სქესობრივი ურთიერთობებისგან თავის შეკავებით.

## ეს მნიშვნელოვანია!

თუ ჩატარებული ანალიზის პასუხი დადებითია, თქვენ ხართ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული, ამ ვირუსის მატარებელი, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ შიღძისით დაავადებული. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ ამ დროს შეგიძლიათ ეს ინფექცია სხვას გადასდოთ. აივ ინფიცირებულობის შემთხვევაში ინფექციასთან ბრძოლის ერთადერთ საშუალებას ექიმის რჩევების შესრულება წარმოადგენს.


**ურადება! აივ ინფეციასა და სესოპრივი გზით გადავდა ინფეციას ჰორის მშიდრო კავშირი არსებობს, რადგან ერთის არსებობა ზრდის გაორის გადადების რისკს.**



რაკი ამ გვერდამზე მოხვედი, იმედია ბოლომზე  
გაეწანი ჩვენს მიერ მონაცემულ ინფორმაციას.  
გაგიჩნდა რაიმე დამატებითი შეკითხვები?  
ან მოგერიდოს, აკრიფე ტელეფონის ნომერი

თბილისი – 25 18 19, ბათუმი – 7 42 13  
ქუთაისი – 6 50 26, ზუგდიდი – 2 92 99

და გიჩასუხებენ: „თანაფგომა გისმენთ“



შეგიძლიათ მიმართოთ ასევე საზოგადოებრივ  
გაერთიანება „შემონს“:

თბილისი 18-60-61; 890 18-70-30;  
ქუთაისი: 188-788

თელავი 7-10-94; 890 18-90-30

## კონსულტირებისა და ტასტირებისთვის უგიძლიათ მიზანობრი:

### საიცორმასიო სახადიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომა”

თბილისი: ა.ქურდიანის №21, 25 18 19

ბათუმი: ვ.გორგასალის №113, 7 42 13

ქუთაისი: ოცხელის №2, 6 50 26

ზუგდიდი: კ. გამსახურდიას №206, 2 92 99

### საზოგადოებრივი გართიანება “გამოცი”

თბილისი, ქავთარაძის 16,  
(სამკურნალო კომპინატი, მე-7 სართული),  
ტელ: 18 87 88

თელავი, უნივერსიტეტის 20, ტელ: 7-10-94



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

GEORGIA HIV  
PREVENTION PROJECT



საინფორმაციო მასალა დაიბეჭდა აშშ საერთაშორისო განვითარების  
სააგენტოს მიერ დაფინანსებული საქართველოში აივ პრევენციის  
პროექტის (GHPP) მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს  
RTI International, Save the Children, PATH, და IOCC