



სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციები
(ვენერიული დაავადებები)

აივ/შიდსი

აღბათ იყი, რომ შიფსის პრობლემა დღესდღეობით
კარგობრიობისათვის გადაუჭრელი პრობლემაა.
სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს საინფორმაციო მასა-
ლა, რათა პასუხი გაეყოს იმ კითხვებს, რომლებიც
ვფიქრობთ, შენ უკვე ღიფი ხანია გაინტერესებს და
რომელიც დაგეხმარება თავად განსაზღვრო შენი
მომავალი. ეს ბროშურა საშუალებას მოგცემს,
თავიდან აიცილო: სარისკო ქრევა, საფრთხე და
არყოფნით გამოწვეული შიში.

რა თქმა უნდა, ეს ბროშურა ამომხურავ ინფორ-
მაციას ვერ მოგანვდის და შესაძლებელია დამ-
ატებითი კითხვების დაკმაყოფილების სურვილიც
გაგიჩნდეს.

ამისათვის აკრიფე ტელეფონის ნომერი:

თბილისი – 25 18 19, ზაფხუმი – 7 42 13

ქუთაისი – 6 50 26, ზუგდიდი – 2 92 99

ქრეფრის "თანადგომა" კონსულტანტები უპასუხობ
არ დატოვებენ შენს შეკითხვებს.

გახსოვდეს: ყოველი ზარი ანონიმური და უფასოა.

სქესობრივი გზით გადავადები ინფექციები (სგბი)



როგორ იწიფება სგბი?

სგბი იწიფება, როგორც სქესობრივი გზით გადავადები ინფექციები. ასეთ ინფექციებს ვენერიულ დაავადებებსაც უწოდებენ.



როგორი დაავადებაა სქესობრივი გზით გადავადები ინფექცია?

ეს ისეთი დაავადებაა, რომელიც გადავადება ერთი ადამიანიდან მეორეს სქესობრივი კონტაქტის ანუ სქესობრივი თანაცხოვრების დროს.



რაგვანი სგბი არის სწრაფი დღეს?

დღესათვის ცნობილია 30-ზე მეტი სგბი, მათგან ყველაზე:

- სიფილისი
- გონორეა ანუ ტრიპერი
- ტრიქომონიაზი
- ქლამიდიოზი
- სოკოვანი ინფექცია
- აივ/შიდსი



რა ნიშნები გვხვდება ყველაზე ხშირად სგბი-ს დროს?

სქესობრივი გზით გადავადები ინფექციების დროს ძირითადად ვხვდებით შემდეგი ნიშნები:

- ▶ წვის შეგრძნება შარდვის დროს;
- ▶ სიწითლე სასქესო ორგანოების მიდამოებში;
- ▶ გამონაყარი სასქესო ორგანოებზე, კანზე და ლორწოვან გარსებზე - მავალითად, პირის ღრუში, საშოში.

- ▶ გამონადენი;
- ▶ ქაფილი;
- ▶ ტკივილი მუცლის ქვედა არეში



ყოველთვის ვლინდება ეს ნიშნები ანუ სიმპტომები სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების დროს?

სქესობრივი გზით გადადები ინფექციები ხანდახან მიმდინარეობს ფარულად ანუ აღამიანი ვერ გრძნობს, რომ იგი ინფიცირებულია რაიმე კონკრეტული დაავადებით. ნიშნები ჩნდება უკვე გართულებების პერიოდში.



გასსოვდეს, შეიძლება დაავადებულ აღამიანს ბარკბნულად არაფერი ეზყოფოდეს, ვაბრამ ის ინფიცირებულია და გადამდებია!



როგორ გადადის სგბი?

სგბი ძირითადად გადაეცემა სქესობრივი კავშირის დროს. სქესობრივი კავშირი შეიძლება იყოს:

- ▶ ვაგინალური ანუ მამაკაცის სასქესო ორგანოს საშომო შეღწევა;
- ▶ ანალური ანუ მამაკაცის სასქესო ორგანოს უკანა ტანში შეღწევა;
- ▶ ორალური ანუ „მინეტი“.

სქესობრივი კავშირის ამ სამივე სახის დროს შეიძლება მოხდეს სგბი-ს გადაცემა ერთი აღამიანიდან მეორეზე.



**მოვალეთვის გამოიყენე პრეზერვატივი! თუ გაინა,
სასწრაფოდ შენუჭვივა სქესობრივი
აქტი და აუსილაზლად გამოიყენე ახალი
პრეზერვატივი!**



რა უნდა ვიცოდე სიფილისის შესახებ?

სიფილისის გადაცემის გზებია:

- ▶ დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური;
- ▶ სისხლი - მაგალითად, ინფიცირებული სისხლის გადასხმისას;
- ▶ მჭიდრო საყოფაცხოვრებო ურთიერთობა დაავადებულთან-მაგალითად, ინფიცირებულის თეთრეულის ან ჭურჭლის გამოყენება;
- ▶ დელიდან შვილზე ორსულობის ან შშობიარობის დროს.



რა ნიშნები ახასიათებს სიფილისს?

დაინფიცირებიდან 1-4 კვირის პერიოდში ჩნდება მუწუკისმსგავსი წარმონაქმნი წყლულოვანი თავით ანუ შანკრი. ის ხშირად უმტკივნეულოა.

ხშირად შანკრი ჩნდება ღრმად საშოში ან საშვილოსნოს ყელზე და ამიტომ უხილაფია. 10-15 დღეში შანკრი თავისით ქრება, მაგრამ დაავადება აგრძელებს განვითარებას.

2 თვიდან 3 წლამდე პერიოდში ჩნდება გამონაყარი, ლაქები, წყლულები კანზე და ლორწოვან გარსზე. ახასიათებს თმის ცვენა, კუნთების ტკივილი;

თუ გპონია უმეტხვეპიტი სქესობრივი კავშირი პრეზერვატივის ბარეშე ან გაინა პრეზერვატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირაბული, დაუყოვნაბლივ მიმართე ეპიძს.



რა გართულავები შეიძლება მოჰყვას სიფილისს, თუ არ ვიძუარნალება?

ინფიცირებიდან 3-10 წლის შემდეგ არანამკურნალები დაავადება იწვევს კანის, ნერვული და ძვალ-სახსროვანი სისტემის, შინაგანი ორგანოების დაზიანებას. ორგანიზმი იხრწნება და აღადიანი კვდება.



რა შემთხვევაში გავიკითო ანალიზი სიფილისზე?

- ▶ თუ შეამჩნეე შხნერს, დაუყოვნებლივ გაიკეთე ანალიზი.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუ არაფერი გაწუხებს, მაგრამ ეჭვი გუბარება, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმ-ვენეროლოგს.

დროული მკურნალობის შედეგად სიფილისი იკურნება.



რა უნდა ვიცოდე ტრიპერის ანუ გონორეას შესახებ?

გონორეა აზიანებს არა მარტო შარდ-სასქესო სისტემას, არამედ სწორ ნაწლავს, პირის ღრუს ლორწოვან გარსს, თვალებს და სხვ.



როგორ გადავსება გონორეა?

გონორეას გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე – ვაგინალური, ორალური და ანალური.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარვატივის გარეშე ან გაიხა პრეპარვატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა ნიშნები ახასიათებს გონორეას?

ყველაზე დამახასიათებელი ნიშანია საშოდან მოყვითალო-მომწვანო გამონადენი არასასიამოვნო სუნით. გონორეას ნიშნები ჩნდება ინფექციის შეჭრიდან მე-3 მე-7 დღეს. 10-14 დღის შემდეგ დაავადების ნიშნები შეიძლება გაქრეს თავისით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აღადიანი გამოჯანმრთელდა. ამ მომენტიდან დაავადება გადადის ქრონიკულ სტადიაში და პერიოდულად შესაძლებელია მოხდეს გამწვავება.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას გონორეას, თუ არ ვიმკურნალავ?

არანამკურნალებმა გონორეამ შეიძლება გამოიწვიოს შინაგანი ორგანოების დაზიანება, უშვილობა, იმპოტენცია და სხვა



რა შემთხვევაში გავიქათო ანალიზი გონორეაზე?

იმ შემთხვევაში თუ ეჭვი შეგეპარა, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს და გაიკეთე ანალიზი. სრულფასოვანი მეურნალობის შემთხვევაში გონორეა იკურნება.



რა უნდა ვიცოდე ქლამიდოზის შესახებ?

ქლამიდოზის დროს ზიანდება არამართო შარდ-სასქესო სისტემა, არამედ სხვა ორგანოებიც. მაგალითად ნერვული სისტემა.

თუ გპოვია შემთხვევითი სქამსორივი კავშირი პრეპარვატივის გარეშე ან გაინა პრეპარვატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



როგორ გადაეცემა ქლამიდიოზი?

ქლამიდიოზის გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური;

ქლამიდიოზი გადაეცემა ასევე ორსული დედიდან ნაყოფზე.



რა ნიშნები ახასიათებს ქლამიდიოზს?

ამ დაავადებისათვის დამახასიათებელია გამჭვირვალე, უფერო გამონადენი და ტკივილი შარდვისას. ჩივილები ჩნდება 1-2 კვირის შემდეგ. ხშირად ქლამიდიოზი მიმდინარეობს ყოველგვარი ნიშნების გარეშე და ხდება მიზეზი ადრეული მუცლის მოშლისა და უშვილობის.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას ქლამიდიოზს, თუ არ ვიმკურნალავ?

ქლამიდიოზი გადაეცემა ორსული დედიდან ნაყოფს და ბავშვი შეიძლება გაჩნდეს თანდაყოლილი სიმსხინჯეებით.



რა შემთხვევაში გაიქართო ანალიზი ქლამიდიოზზე?

იმ შემთხვევაში, თუ ექვე შეგეპარა, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს და გაიკეთე ანალიზი. სრულფასოვანი მკურნალობის შემთხვევაში ქლამიდიოზი იკურნება.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის გარეშე ან ბაიზა პრეპარატივი და ეჭვი გამარაბა, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა უნდა ვიცოდეთ ტრიქომონიაზის შესახებ?

ტრიქომონიაზი საკმაოდ ვერაგი დაავადებაა. იგი აზიანებს შარდ-სასქესო სისტემას; შესაძლოა დაფაროს სხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების ნიშნები.



როგორ გადაეცემა ტრიქომონიაზი?

ტრიქომონიაზის გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური; შესაძლებელია ტრიქომონიაზი გადაეცეს საყოფაცხოვრებო გზით, მაგალითად, სხვისი თეთრეულით ან საბანაო ღრუბელის გამოყენებისას.



რა ნიშნები ახასიათებს ტრიქომონიაზს?

დაავადების პირველი ნიშნები ვლინდება 3-25 დღის მანძილზე, თუმცა ხშირად მიმდინარეობს ყოველგვარი გამოვლინების გარეშე. დამახასიათებელი სიმპტომებია: ქავილი და გაღიზიანება სასქესო ორგანოების მიდამოში და ქაფისებური გამონადენი არასასიამოვნო სუნით.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას ტრიქომონიაზს, თუ არ ვიკურნალავ?

არანამეურნალებმა ტრიქომონიაზმა შესაძლოა გამოიწვიოს უშვილობა.

თუ გაონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის გარეშე ან გაინა პრეპარატივი და ეჭვი გამარაბა, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა შემთხვევაში გავიკეთო ანალიზი ტრიქომონიაზე?

დაავადების პირველივე ნიშნების გაჩენისთანავე მიმართეთ ექიმს.
სრულფასოვანი მკურნალობის შემთხვევაში ტრიქომონიაში იკურნება.



რა უნდა ვიცოდეთ სოკოვანი ინფექციის შესახებ?

ამ დაავადების გამოწვევი მიკროორგანიზმი ხშირად ხდება ორგანიზმში სხვა სეგი-ის გამოწვევებთან ერთად, თუმცა ასევე შეიძლება განხდეს ქლამიდიოზის, ტრიქომონიაზის, ვირუსული ინფექციების და სხვა დაავადებების მკურნალობის, აგრეთვე ფეხმძიმობის შემდეგ.



რა ნიშნები ახასიათებს სოკოვან ინფექციას?

ამ დაავადების მიმდინარეობა შეიძლება დაიყოს ორ სტადიად:
მატარებლობა - ამ დროს არანაირი ნიშნების გამოვლინება არ ხდება, მაგრამ ამ აღაძიანმა შეიძლება გადადოს ეს დაავადება სხვას;
მწვავე პერიოდი - გრძელდება დაახლოებით 2 თვე და ახასიათებს: კანის და ლორწოვანი გარსის შეწითლება, შეშუპება, გამონაყარი. დამახასიათებელია ქავილის და წვის შეგრძობა სასქესო ორგანოების არეში, ხაჭოსებრი გამონადენი.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის გარეშე ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი გამარაბა, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა გართულავები შეიძლება მოჰყვას სოკოვან ინფექციას, თუ არ ვიმკურნალავ?

თუ არ იმკურნალავ, დაავადება გადადის ქრონიკულ სტადიაში. სრულფასოვანი მკურნალობის შემთხვევაში სოკოვანი ინფექცია იკურნება.



უნდა გვახსოვდეს, რომ მკურნალოვა აუსილაბელია ორივე პარტნიორისთვის, სხვა შემთხვევაში მკურნალოვან აზრი არა აქვს.



შეიძლება თუ არა მე თვითონ ჩავიტარო სგგი-ს მკურნალოვა?

არა! სგგი-ს მკურნალობას უნდა აწარმოებდეს ექიმი-ვენეროლოგი; თვითმკურნალობა საშიშია შემდეგი მიზეზების გამო:

- შენ თვითონ ვერ მიხვდები, რომელი სგგი-თი ხარ ინფიცირებული და ვერ შეარჩევ შესაბამის მკურნალობას;
- თუ სგგი-ს სწორად არ უმკურნალავ, ის გადავა ქრონიკულ ფორმაში და განვითარდება გართულებები, კერძოდ, უშვილობა, აბორტი, საშვილოსნოს გარე ორსულობა, ქრონიკული ტკივილები, სხვა ორგანოების (ღვიძლი, თირკმელები, თავის ტვინი, სხვ) დაზიანება, და ზოგიერთ შემთხვევაში სიკვდილი;
- ანტიბიოტიკების (კანამიცინი, გენტამიცინი და სხვ) არასწორი მიღება გამოიწვევს იმას, რომ დაავადების

თუ გპონია შემთხვევითი სქმსორივი კავშირი პრეპარატივის ბარეში ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი ბეპარეა, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.

- გამომწვევი ვახდება მდგრადი წამლებისადმი ანუ მასზე წამლები აღარ იმოქმედებს და ამიტომ ამ დაავადების მკურნალობა საკმაოდ გაძნელებულია;
- მკურნალობის კურსი უნდა მიყვანილ იქნას ბოლომდე იმის მიუხედავად, გაქრა ჩივილები თუ არა, ამის გაკონტროლება კი მხოლოდ ექიმს შეუძლია.

აივ/შიდსი



რას ნიშნავს აივ?

აივ არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. ჩვენ მას პირობითად ვუწოდებთ „შიდსის ვირუსს“



რას აზიანებს შიდსის ვირუსი?

შიდსის ვირუსი აზიანებს ორგანიზმის დაცვის სისტემას ანუ იმუნიტეტს, რომელიც შენს ორგანიზმს იცავს სხვადასხვა ინფექციებისგან. ამ ვირუსის მიერ გამოწვეულ ინფექციას ვუწოდებთ აივ ინფექციას.

აივ ინფექცია ვითარდება ნელა. შეიძლება გავიდეს 3-10 წელი, სანამ ადამიანი მიხვდება, რომ ის დაავადებულია და აქვს შიდსი . მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ადამიანს ავადმყოფობის არაფერი ეტყობა, ის მაინც გადაამტვრის და შეუძლია გადადოს ვირუსი სხვა ადამიანს.



ვტყობა თუ არა ადამიანს, როგორ დანაწილებულია შიღსით?

გარეგნულად შეუძლებელია მიხვდე, ადამიანი დაავადებულია შიღსით თუ არა. დროთა განმავლობაში შიღსის ვირუსი ანგრევეს ორგანიზმის დაცვის უნარს, ვითარდება სხვადასხვა დაავადება, რომლებიც რთულდება და იწვევეს სიკვდილს. ამ გართულებების გამოვლინების სტადიას ეწოდება შიღსი.



როგორ გადასახვა შიღსის ვირუსი?

შიღსის ვირუსი გადაეცემა

- დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით: სქესობრივი კონტაქტი საშოში ორალური ანუ მინეტი ანალური ანუ უკანაღში სქესობრივი კავშირი
- სისხლის კონტაქტი - აივ ინფიცირებული სისხლით დაბინძურებული შპრიცის, თუ სხვა სამედიცინო ან კოსმეტოლოგიური (მანიკური, პედიკური) ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში.
- ინფიცირებული ორსული დედისაგან ნაყოფზე, მშობიარობის და ძუძუთი კვების დროს.

შიღსის ვირუსი არ გადაეცემა:

- დახველებით, დაცემინებით, ან კოცნით
- ხელის ჩამორთმევით, მოხვევით
- დაავადებულის ჭურჭლით, თეთრეულით
- საერთო ტუალეტით და აბაზანით სარგებლობისას
- საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ტრანსპორტში (ავტობუსი, ტროლეიბუსი, მატარებელი და სხვ.)
- მწერების და ცხოველების ნაკბენით

იმისათვის, რომ დავადებინოთ, არის თუ არა აღამიანი შიდსის ვირუსის მატარებელი აივ ინფიცირებული, საჭიროა გაკეთდეს სისხლის ანალიზი შიდსზე.



იკურნება თუ არა შიდსი?

შიდსის სრული განკურნება დღესდღეობით შეუძლებელია, მაგრამ სპეციალური ძვირადღირებული წამლებით შესაძლებელია სიცოცხლის გახანგრძლივება.



განსჯდეს, რომ აივ/შიდსისგან თავის დაცვის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა პრეპარატივი!

რაკი ამ გვერდამდე მოხვედი, იმედია ზოლომდე
გაურანი ჩვენს მიერ მონოღებულ ინფორმაციას.
გავიჩნდა რაიმე დამატებითი შეკითხვები?
არ მოგერიდოს, აკრიფე ტელეფონის ნომერი

თბილისი – 25 18 19, შათუმი – 7 42 13
ქუთაისი – 6 50 26, ზუგდიდი – 2 92 99

და გიპასუხებენ: "თანადგომა გისმენთ"

შეგიძლიათ მიმართოთ ასევე საზოგადოებრივ
გაერთიანება „ზემონს“:

თბილისი 18-60-61; 890 18-70-30;
ქბელი საზი: 188-788

თელავი 7-10-94; 890 18-90-30

**კონსულტირებისა და ტესტირებისთვის
შეგიძლიათ მივართოთ:**

**საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
ცენტრი “თანადგომა“**

თბილისი: ა.ქურდიანის №21, 25 18 19
ბათუმი: ვ.გორგასალის №113, 7 42 13
ქუთაისი: ოცხელის №2, 6 50 26
ზუგდიდი: კ. გამსახურდიას №206, 2 92 99

საზოგადოებრივი გაერთიანება “გაომონი“

თბილისი, ქავთარაძის 16,
(სამკურნალო კომბინატი, მე-7 სართული),
ტელ: 18 87 88
თელავი, უნივერსიტეტის 20, ტელ: 7-10-94



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**GEORGIA HIV
PREVENTION PROJECT**

საინფორმაციო მასალა დაიბეჭდა აშშ საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს მიერ დაფინანსებული საქართველოში აივ პრევენციის
პროექტის (GHPP) მხარდაჭერით. პროექტს ახორციელებს
RTI International, Save the Children, PATH, და IOCC