

რატომ არის საჭირო ტესტირება

აივ/შიდსზე



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

GEORGIA HIV  
PREVENTION PROJECT



საინფორმაციო მასალა დაბეჭდა აშშ საერთაშორისო განვითარების  
სააგენტოს მიერ დაფინანსებული საქართველოში აივ პრევენციის  
პროექტის (GHPP) მხარდაჭერით.

პროექტს ახორციელებს

RTI International, Save the Children, PATH,

საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი” და

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომა”

## ა03/შ04ს0 საქართველოში

აივ-ი (ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში შექრის შემდეგ აზიანებს ორგანიზმის იმუნურ სისტემას, რის შედეგად ქვეითდება იმუნუტეტი (ორგანიზმის დამცველობითი უნარი, გაუმკლავდეს სხადასხვა ინფექციებსა და სიმსიგნურ დაავადებებს).

აივ-ით გამოწვეულ დაავადებას ვირუსის შექრის მომენტიდან სიცოცხლის ბოლომდე ეწოდება აივ ინფექცია.

შიდსი (შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი) არის აივ ინფექციის ბოლო სტადია, როდესაც ავადმყოფს უკითარდება გარკვეული, ე.წ. ოპორტუნისტული დაავადებები (ძირითადად ინფექციური და/ან სიმსიგნური ბუნების) და იმუნური სისტემის მძიმე დაზიანება.

აივ-ის დროული დიაგნოსტიკა და დროულად დაწყებული მკურნალობა საშუალებას იძლევა, თავიდან ავიცილოთ სიცოცხლისათვის საშიში გართულებების განვითარება.

საქართველოში 2011 წლის მარტის მონაცემებით რეგისტრირებულია აივ ინფიცირების 2752 შემთხვევა. ინფიცირების უმეტესი წილი მოდის ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარებაზე (56,9%) და დაუცველ (კონდომის გარეშე) სქესობრივ ურთიერთობებზე, როგორც პეტერო (36,3%), ასევე ჰომოსექსუალური ჯაგშირების დროს (3,1%).

არსებობს აივ-ის გადაცემის 3 ძირითადი გზა. ესენია:

- ჯანმრთელი ადამიანის სისხლის კონტაქტი ინფიცირებული ადამიანის სისხლთან - შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმა, სამედიცინო მანიპულაციები, არასტერილური სამედიცინო ან კოსმეტოლოგიური ინსტრუმენტების ხმარება, ზიარი შპრიცების, ან სხვა საინჟენიორო ატრიბუტიების გამოყენება ინექციური ნარკომანიის შემთხვევაში, ტატუირება და სხვ.
- დაუცველი (კონდომის გარეშე) სქესობრივი ურთიერთობები, როგორც პეტეროსექსუალური, ასევე პომოსექსუალური - ნებისმიერი სახის დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი (ვაგინალური, ანალური, ორალური).
- ვერტიკალური გზა - აივ ინფიცირებული დედიდან შვილზე ორსულობის, მშობიარობის ან ძუძუთი კვების პროცესში.

მხოლოდ აივ-ზე სისხლის ტესტირებამ შეიძლება გასცეს პასუხი კითხვას, არის თუ არა ადამიანი აივ ინფიცირებული, რადგანაც ინფიცირების საწყის პერიოდში (რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე წელი) ადამიანს შესაძლოა არ გააჩნდეს რაიმე ჩივილი ან სიმპტომი.

ამიტომ, თუკი თქვენ ოდესმე მაინც გქონიათ სარისკო ქცევა, რომელსაც შეეძლო გამოეწვია აივით ინფიცირება (როგორიცაა ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარება ან დაუცველი სქესობრივი კავშირი) და თქვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი და თქვენი ახლობლების ჯანმრთელობა, აუცილებელია გაიკეთოთ აივ-ზე სისხლის ანალიზი.

## ვისთვის არის ოპონირებული აივ/შილუე კონსულტირება და ტესტირება?

- ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები;
- ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორები;
- პირები, რომლებიც აღნიშნავენ მრავლობით დაუცველ სქესობრივ კავშირებს;
- კომერციული სექსის მუშაკები;
- მამაკაცები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი მამაკაცებთან;
- პირები, რომლებსაც გადატანილი აქვთ ან ავად არიან სქესობრივი გზით
- გადამდები ინფექციებით (სიფილისი, გონორეა, ქლამიდია, ტრიქომონიაზი და სხვ.);
- პირები, რომლებსაც ხშირად უტარდებათ სამედიცინი მანიპულაციები;
- სისხლის ან სისხლის პროდუქტების რეციპიენტები;
- პირები, რომლებსაც გადატანილი აქვთ ან ამჟამად არიან ავად ქრონიკული B, C და D ჰეპატიტებით;
- ორსული ქალები, ქალთა კონსულტაციებში ან სამშობიარო სახლებში მიმართვისას.

## როგორ ხდება აივ-ზე კონსულტირება და ტესტირება?

თუ თქვენ გადაწყვეტთ აივ-ზე კონსულტირება/ტესტირებას, კონსულტანტი დეტალურად გიამბობთ აივის გადაცემის გზების შესახებ, გაგაცნობთ ტესტირების პროცედურას, გაგვემთ პასუხს თქვენთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე. კონსულტანტი გაგესაუბრებათ ასევე ტესტირების სავარაუდო შედეგებზე (აივ დადებითი, აივ უარყოფითი, გაურკვეველი აასუხი) და მოგცემთ რჩევებს, თუ რა უნდა მოიმოქმედოთ თითოეული ამ ვარიანტის შემთხვევაში. თუ ამ გასაუბრების (კონსულტირების) შემდეგ თქვენ თანახმა იქნებით, ჩაიტაროთ ტესტირება, კონსულტანტი მიგაცილებთ საპროცედურო ოთახაძე, სადაც მოხდება თქვენი სისხლის აღება ანალიზის/ტესტის ჩასატარებლად. კონსულტირება და ტესტირება მიმდინარეობს მეგობრულ, მშვიდ და კომფორტულ ვითარებაში.

კონსულტირება და ტესტირება აივ-ზე არის ანონიმური და კონფიდენციალური. თქვენ შეგიძლიათ, თავისუფლად ისაუბროთ კონსულტანტთან თქვენი ქცევის (როგორც სქესობრივი, ასევე ნარკოტიკების მოხმარების) ყველა დეტალზე. კონსულტანტს არ აქვს უფლება, გაანდოს თქვენგან შიღებული ინფორმაცია სხვა, მესამე პირს. ტესტირების შედეგები გეცნობებათ მხოლოდ თქვენ. თუ თქვენ აღმოგაჩნდებათ აივ ინფექცია, თქვენ დეტალურად გაგაცნობებ, თუ რა სტადიაზე დაგჭირდებათ მკურნალობა და რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ დაავადების პროგრესირება.

თუ თქვენ არ აღმოგაჩნდებათ აივ ინფექცია, კონსულტანტი მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ შემდგომში როგორ აიცილოთ თავიდან აივ ინფიცირების საფრთხე.

## ა03/შიდსის ლაპორატორიული დიაგნოსტიკა

დღეისათვის აივ ინფექციის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ძირითადი მეთოდები 2 ჯგუფად იყოფა: 1) პირველადი ანუ სკრინინგული და 2) დამადასტურებელი ანუ კონფირმაციული.

სკრინინგულ მეთოდებს შორის ყველაზე ფართოდ გამოიყენება აივ-ზე ანტისენ्शულების გამოვლენა სწრაფი მარტივი ტესტით, რომლის დროსაც ანალიზისთვის ხდება სისხლის წვეთის აღება თითოდან. ტესტის პასუხის მიღება შესაძლებელია სწრაფად, 10-15 წუთში. აღნიშნული მეთოდიკა გამოირჩევა მაღალი მგრძნობელობითა და სპეციფიურობით, ამიტომ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში კონფირმაციული ტესტის ჩატარება საჭირო აღარ არის.

გასათვალისწინებელია ე.წ. “ფანჯრის პერიოდის” არსებობა. ეს არის პერიოდი ინფიცირების მომენტიდან 8-10 კვირის (2-3 თვის) განმავლობაში, როდესაც სისხლის სკრინინგული ანალიზი ვერ გამოავლენს, არის თუ არა ადამიანი აივ-ით ინფიცირებული.

სკრინინგული ტესტის დადგებითი შედეგის შემთხვევაში კვლევა გრძელდება დამადადასტურებელი, ანუ კონფირმაციული მეთოდით, რომელიც უკვე დანამდვილებით ადგენს, არის თუ არა ადამიანი აივ ინფიცირებული. კონფირმაციული ანალიზის შედეგის მისაღებად საჭიროა დაახლოებით 7-14 დღე. თუ კონფირმაციულმა ანალიზმა აჩვენა დადგებითი პასუხი, მაშინ დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი არის აივ ინფიცირებული, ანუ მას აქვს აივ ინფექცია. თუ კონფირმაციულმა ანალიზმა აჩვენა უარყოფითი პასუხი, მაშინ დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი არ არის აივ ინფიცირებული, ანუ მას არ აქვს აივ ინფექცია.

## ა03-ზე ტესტირების შედეგები

არსებობს ტესტირების პასუხის 3 ვარიანტი: ნეგატიური, პოზიტიური და გაურკვეველი.

**ნეგატიური** (უარყოფითი) - პიროვნება არ არის აივ ინფიცირებული, ან ინფიცირების მომენტიდან ჯერ არ გასულა 3 თვე და ადამიანი იმყოფება “ფანჯრის პერიოდში”. შესაბამისად, თუ ადამიანს სარისკო ქცევა ჰქონდა (როგორიცაა ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარება ან დაუცველი სქესობრივი კავშირი), მიზანშეწონილია განმეორებითი ტესტირება 3 თვის შემდეგ.

**პოზიტიური** (დადებითი) - პიროვნება არის აივ ინფიცირებული, თუმცა ინფიცირება დადასტურებულად ითვლება მხოლოდ დამადასტურებელი (კონფირმაციული) მეთოდით ტესტირების შედეგის საფუძველზე.

**გაურკვეველი** - პიროვნების აივ სტატუსი დაუდგენელი რჩება, საჭიროა განმეორებითი ტესტირების ჩატარება.

## რა სარგებლობა მოაქვს აიგ-ზე ტმსტირებას?

მიუხედავად აიგ-ზე ტესტირების შედეგისა, კონსულტანტი მოგაწვდით საჭირო ინფორმაციას ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. თქვენ მიიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას აიგ/შიდსის შესახებ და გეცოდინებათ, როგორ დაიცვათ საქუთარი თავი და თქვენთვის ძვირფასი ადამიანები ამ ინფექციისაგან.

თუ ტესტის პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდა, თქვენ შევბით ამოისუნთქავთ, ხოლო შემდგომში უფრო გაფრთხილდებით და დაფიქრდებით, ვიდრე ჩაიდგნოთ სარისკო ქცევას, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი აიგ-ით ინფიცირება.

თუ ტესტის პასუხი დადებითი აღმოჩნდა, თქვენ შეგეძლებათ, კონსულტანტთან ერთად დაგეგმოთ თქვენი მომავალი ისე, რომ გააგრძელოთ წევული ცხოვრება. თქვენ შეიტყობთ იმ ადამიანებზე, ვინც მრავალი წლის განმავლობაში ცხოვრობს აიგ ინფექციით და ამავე დროს აგრძელებს სრულფასოვან ცხოვრებას და მოღვაწეობას, ასევე გაიგებთ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მუშაობენ აიგ ინფიცირებულებთან და ებმარებიან მათ ფსიქოლოგიური თუ სოციალური პრობლემების დაძლევაში.

რაც უკელაზე მნიშვნელოვანია, საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგეძლებათ უფასოდ ჩაიტაროთ კველა სამედიცინო გამოკვლევა და ასევე უფასოდ მიიღოთ მკურნალობა კონფიდენციალობის სრული დაცვით.

## სად შეიძლება ჩაგითაროთ აიგ-ზე ტმსტირება?

საინფორმაციო-სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომა”

თბილისი: ა. ქურდიანის №21, ტელ: 225 18 19  
ქუთაისი: პ. ოცხელის №2, ტელ: 26 50 26  
ბათუმი: ვ. გორგასლის №113, ტელ: 27 42 13  
ზუგდიდი: კ. გამსახურდიას №206, ტელ: 22 92 99

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

თბილისი: ალ. ყაზბეგის №16, ტელ: 239 80 18

საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”

თბილისი: ქავთარაძის №16, ტელ: 218 87 88  
თელავი: უნივერსიტეტის №20, ტელ: 27 10 94